



NIK-L-BLOK™

Crème barrière



Piège le Nickel



Piège le Cobalt



Hypoallergénique
et sans parfum



**FAITES VOUS PARTIE DES 10%
DE PERSONNES SOUFFRANT
D'ALLERGIE AU NICKEL ?**

Protégez votre peau de l'eczéma provoqué
par l'allergie au nickel et au cobalt avec la
crème barrière **NIK-L-BLOK™** brevetée.

#Nonàl'AllergieAuNickel

 Chemotechnique
cosmeceuticals






ALLERGIE DE CONTACT AU NICKEL

L'allergie de contact est le fait d'être sensibilisé à un haptène comme le nickel ou le cobalt. Les ions de ces métaux, comme tous les haptènes, sont de petites molécules chimiquement réactives qui pénètrent et se lient aux protéines de la peau. L'allergie au nickel est l'allergie de contact la plus courante, c'est donc celle dont on parle le plus, mais le principe est le même pour l'allergie au cobalt.

OBJET EN MÉTAL LIBÉRANT DES IONS NICKEL



L'EXPOSITION AU NICKEL PROVOQUE LA SENSIBILISATION

La sensibilisation au nickel se produit lorsque l'exposition dépasse un certain seuil. Le système immunitaire considère alors le nickel lié aux protéines de la peau comme une menace. Ce seuil est individuel et varie considérablement d'un individu à l'autre, il pourra être inférieur à celui de votre famille, de vos amis ou de votre conjoint.

Une fois que vous avez développé une allergie au nickel, toute exposition de votre peau au nickel pourra déclencher une dermatite de contact allergique.

DERMATITE DE CONTACT ALLERGIQUE

Contrairement à la plupart des autres types d'allergies, les allergies de contact ne sont pas des réactions immédiates mais des réactions retardées. Une fois que vous avez développé une allergie au nickel, tout contact avec du nickel induira une dermatite de contact qui n'apparaîtra pas immédiatement mais au bout de 12 à 48 heures. Cette dermatite pouvant persister parfois plusieurs semaines, un seul contact avec du nickel peut donc entraîner des symptômes durables.

SYMPTÔMES DE LA DERMATITE DE CONTACT ALLERGIQUE

- Rougeur, éruption cutanée
- Cloques sur la peau
- Gonflement
- Démangeaisons, sécheresse de la peau localisée





DIAGNOSTIC

PATCH TEST

Contrairement aux allergies aux aliments, aux poils d'animaux ou aux pollens, les allergies de contact ne sont pas diagnostiquées par prick test mais par patch test.

Si vous présentez des symptômes de dermatite de contact allergique ou que vous souffrez d'eczéma non diagnostiqué, vous devez consulter un médecin. Un médecin spécialisé déterminera si vous avez une allergie de contact (au nickel ou à d'autres haptènes connus) en effectuant un patch test.

LE NICKEL AU QUOTIDIEN

Le nickel se trouve dans de nombreux objets que l'on manipule tous les jours, l'évitement est donc difficile. Pour savoir si les objets métalliques rejettent du nickel, vous pouvez les tester vous-même avec un test simple à réaliser en une seule étape, le **Chemo Nickel Test™**. Il peut être très utile, pour les personnes souffrant d'allergie de contact au nickel, de tester les objets métalliques pour savoir s'ils renferment du nickel avant leur achat ou leur utilisation.

OBJETS CONTENANT DU NICKEL:

- Boucles d'oreilles et piercing
- Colliers, bagues, bracelets, fermoirs de soutien-gorge, fermetures Eclair, boucles de ceinture et boutons de jeans
- Bracelets de montre et bracelets connectés
- Ordinateurs portables
- Téléphones portables et tablettes
- Clés, pièces de monnaie et outils métalliques
- Montures de lunettes
- E-cigarettes
- Boutons de porte

GERER L'ALLERGIE DE CONTACT AU NICKEL

L'allergie de contact au nickel est chronique une fois que l'on a été sensibilisé. La seule façon d'éviter de développer une dermatite de contact allergique au nickel est d'éviter tout contact avec le nickel. La dermatite de contact allergique est habituellement traitée par l'application de crème contenant des corticostéroïdes. Ce traitement offre seulement un soulagement temporaire, il atténue les symptômes mais ne fournira aucune prévention.





ÉVITER LA SENSIBILISATION ET L'ECZEMA À L'AIDE DE NIK-L-BLOK™

NIK-L-BLOK™ est une crème barrière innovante avec une formule brevetée qui piège les ions nickel et cobalt protégeant ainsi efficacement la peau contre le développement d'une dermatite de contact allergique.

Lors de la manipulation d'objets libérant du nickel ou du cobalt, la crème barrière **NIK-L-BLOK™** permettra de prévenir la sensibilisation au nickel ou au cobalt et donc une allergie de contact. Si vous avez déjà développé une allergie de contact, la crème **NIK-L-BLOK™** aidera à protéger votre peau et vous permettra de toucher des objets métalliques sans se soucier de développer un eczéma.



NIK-L-BLOK™

La formule brevetée de **NIK-L-BLOK™** utilise le DTPA (un chélateur d'ions métalliques) qui empêche les ions métalliques libres de nickel ou de cobalt de pénétrer dans la peau. Appliquer une couche protectrice de **NIK-L-BLOK™** sur toutes les zones cutanées en contact avec les métaux. Appliquer selon les besoins.

Sans parfum - Recommandé par les dermatologues.

Pour plus d'informations, visitez les sites www.destaing.com ou www.cosmeceuticals.se ou contactez-nous à l'adresse suivante contact@destaing.com

#Nonàl'AllergieAuNickel



LABORATOIRE
DESTAING

Distribué en France par
Laboratoire Destaing
45 Bd Marcel Pagnol - 06 130 GRASSE
Tel 04 93 42 02 00 - Fax 04 93 42 03 00
www.destaing.com

NIK-L-BLOK™ est enregistré et classé comme dispositif médical de classe 1 produit conformément à la directive 93/42/EEC relative aux dispositifs médicaux.
© 2017 Chemotechnique Cosmeceuticals Scandinavia AB

